

Т. К. Ходжайов

## КРАНИОЛОГИЯ УЗБЕКОВ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ (МИЗДАХКАН)

Рассматриваемый здесь краниологический материал с территории Ходжейлинского района Каракалпакской АССР был собран летом 1965 г. при раскопках древнего могильника Миздахкан, известного у местных жителей под названием Гяур-Кала. Как полагает Х. Е. Есбергенов, эти захоронения датируются XVII — началом XX в. н. э. и по характеру захоронения и погребальному инвентарю принадлежат оседлым узбекам<sup>1</sup>.

Получено 10 мужских, 14 женских и 5 детских черепов. Несмотря на малочисленность, эта серия имеет большую научную ценность, так как впервые позволяет рассмотреть краниологические особенности узбеков Южного Приаралья.

Характерное для жителей Среднеазиатского междуречья уплощение в затылочной области черепа выражено слабо и далеко не на всех черепках. Степень деформации, отмеченная по четырехбалльной системе (0—3), на мужских (0,2 балла) и на женских (0,6 балла) черепках незначительная. Морфологические особенности серии сводятся к частому несоответствию между незаращением черепных швов в старческом возрасте и полной атрофией луночковых отростков нижне- и верхнечелюстных костей в результате раннего выпадения всех зубов.

Мужские черепа (табл. 1) обнаруживают малый продольный, выше среднего поперечный и средний высотный размеры мозговой коробки. По черепному указателю они характеризуются брахикранной ее формой. Лоб средненаклонный от назиона с выше среднего развитым надпереносьем.

Лицо среднеширокое и средневысокое по верхнелицевому указателю относится к типу мезен. Оно ортогнатное; в горизонтальной плоскости на уровне назиона выступает сравнительно слабо, а на уровне зигомаксиллярных точек — средне. Размеры носа средние, носовой указатель относится к мезокринным. Угол выступания носовых костей средний. Переносье и спинка носа выступают выше среднего. Глубина клыковой ямок средняя. Орбиты средневысокие.

Женские черепа (с учетом полового диморфизма) весьма близки к мужским. Однако по сравнению с мужскими они более монголоидны. Лицо у них более уплощенное, носовые кости выступают ниже среднего и клыковые ямки углублены менее.

Серию черепов из Миздахкана можно отнести к большой европеоидной расе. Визуальный просмотр черепов с учетом измерительных данных позволяет отнести серию в целом к типу Среднеазиатского междуречья.

Для определения места узбеков Южного Приаралья по краниологическим данным в антропологической классификации народов Средней Азии мы сопоставили узбеков Южного Приаралья с представителями

<sup>1</sup> Х. Е. Есбергенов, Отчет о полевой работе за 1965 г., Архив Ин-та истории, языка и литературы им. Н. Давкараева Каракалпакского филиала АН Узбекской ССР.

Мужские и женские черепа из Миздахкана (XVII—начало XX в.) и сравнительные данные

Признаки	Узбеки Южного Приаралья (Миздахкан)		Миздахкан			
	мужские	женские	III—VIII вв.	IX—XII вв.	XIII—XIV вв.	
1	Продольный диаметр	176,2(10)	169,1(14)	184,8(8)*	178,8(10)	177,3(38)
8	Поперечный диаметр	143,7(10)	141,4(14)	145,5(8)*	150,3(10)	146,9(38)
8:1	Черепной указатель	81,6(10)	84,0(14)	78,9(8)*	84,1(10)	82,6(38)
17	Высотный диаметр	134,4(9)	129,8(14)	135,0(7)*	136,8(12)	136,0(33)
48	Верхняя высота лица	72,4(9)	67,8(13)	76,2(30)	71,9(13)	73,0(40)
45	Скуловой диаметр	133,5(10)	128,3(14)	134,7(29)	136,8(12)	135,0(37)
48:45	Верхнелицевой указатель	54,3(9)	53,1(13)	56,6(29)	52,9(12)	54,0(37)
77	Назомаллярный угол	142,7(8)	145,5(13)	138,5(28)	140,0(11)	141,0(40)
—	Зигмаксиллярный угол	131,0(7)	132,0(13)	125,1(27)	128,0(11)	128,2(37)
52	Высота орбиты	35,4(10)	34,3(13)	34,6(8)*	33,7(12)	35,2(39)
52:51a	Орбитный указатель	89,5(10)	91,0(13)	86,9(8)*	85,7(12)	86,8(38)
54	Ширина носа	25,0(8)	24,3(13)	27,6(31)	25,6(11)	25,7(40)
54:55	Носовой указатель	47,5(8)	49,0(13)	50,1(31)	48,8(11)	48,8(40)
DS	Дакриальная высота	11,7(10)	9,5(13)	12,6(24)	12,8(12)	13,0(34)
DS:DC	Дакриальный указатель	54,3(10)	45,4(13)	53,5(23)	57,4(12)	58,1(34)
SS	Симотическая высота	4,1(10)	2,9(13)	5,0(31)	5,1(12)	4,5(41)
SS:SC	Симотический указатель	47,3(10)	38,6(13)	48,9(31)	50,9(12)	51,4(41)
32	Угол профиля лба	82,1(10)	85,0(13)	79,9(8)*	82,4(12)	81,7(36)
72	Общий угол лица	86,7(8)	88,5(13)	85,6(29)	87,9(12)	85,6(36)
75(1)	Угол выступания носа	27,0(9)	20,5(13)	31,3(30)	33,4(12)	31,8(40)
—	Глубина клыковой ямки в мм	4,49(8)	4,30(13)	4,67(28)	6,00(12)	5,48(38)

\* Средние величины вычислены по недеформированным черепам.

ипа Среднеазиатского междуречья (узбеками) и южносибирского (казахами и киргизами).

В. В. Гинзбургом была изучена большая серия черепов (свыше 300) из старого Ташкентского кладбища Шайхантаур<sup>2</sup>. Черепа из Миздахкана по физическому типу очень близки к черепам этой серии. Отличаются от них более уплощенным лицом. Поэтому вывод В. В. Гинзбурга о том, что черепа из кладбища Шайхантаур относятся к европеоидной бракиранной расе, а именно к типу Среднеазиатского междуречья, целиком применим и к изучаемой нами серии черепов из Миздахкана. Одна черепа из Миздахкана по сравнению с шайхантаурскими более монголоидны по типу.

Черепа из Миздахкана также близки по антропологическому типу к черепам из заброшенных кладбищ пригорода Ташкента, находившихся на левом берегу Боз-Су<sup>3</sup>. Миздахканские черепа отличаются от них более выступающим носом и переносьем. Этим же миздахканские черепа отличаются и от близких между собой серий черепов из Афрасиаба (Самарканд), изученных В. В. Гинзбургом и Н. Г. Залкинд<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> В. В. Гинзбург, Краниологическая характеристика узбеков (по материалам из кладбища Шайхантаур в Ташкенте), Труды Ин-та этнографии АН СССР, 1963, т. 82.

<sup>3</sup> Б. В. Фирштейн, Материалы к краниологии узбеков Ташкента, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», 1951, вып. XIII.

<sup>4</sup> Н. Г. Залкинд, Краниологические материалы из древних кладбищ Самарканд, «Труды Московского об-ва испытателей природы», 1964, т. XIV.

Таблица 2

Сопоставление среднеазиатских серий по степени выраженности монголоидных особенностей

Признаки	Армяне современ- ные	Узбеки Южного Приаралья	Узбеки Ташкента	Узбеки Коканда	Узбеки Самарканда	Казахи современ- ные	Киргизы современ- ные	Тунгузы современ- ные		
									%	%
число случаев (максимальное)	129	11	245	9	30	119	43	56		
77 Назомалярный угол	135,7	142,7	139,8	145,2	142,9	144,3	144,9	149,5	66,7	62,4
— Зигомаксиллярный угол	125,5	131,0	130,1	142,0	130,4	134,4	136,8	142,1	66,8	53,6
75(1) Угол носовых костей	34,0	27,0	26,0	17,5	25,0	24,9	20,9	18,2	83,0	57,5
Дакриальный указатель	62,6	54,3	54,0	—	52,5	49,4	47,7	41,0	69,0	61,0
Симотиический указатель	55,2	47,3	47,2	—	46,3	46,4	41,0	31,9	61,2	37,8
Всего	0 %	—	—	—	—	—	—	100 %	69,3	54,5

Краниологический материал из «Золотой Мулушки» в Самарканде, изученный Т. А. Трофимовой<sup>5</sup>, также оказывается по средним величинам очень близким к черепам из Миздахкана.

Некоторое исключение среди краниологических серий с территории Среднеазиатского междуречья составляют черепа узбеков из Коканда в Фергане (Ак-Мазар), которые по современной программе изучила Н. Г. Залкинд<sup>6</sup>. По сравнению с ними черепа узбеков из Южного Приаралья (Миздахкан) отличаются малым поперечным диаметром черепной коробки, значительно более узким и сильнее профилированным лицом в горизонтальной плоскости, значительно большим углом выпячивания носа. Эти различия объясняются тем, что антропологический тип черепов узбеков из Коканда близок к южносибирскому.

Таким образом, в основном население Узбекистана конца II тысячелетия н. э. относится к европеоидному брахикранному типу Среднеазиатского междуречья с примесью монголоидных черт.

Различия между черепами узбеков Южного Приаралья и представителей южносибирской расы — казахами и киргизами<sup>7</sup> касаются как раз основных расово-диагностических признаков, отличающих европеоидные и монголоидные расы. Миздахканские отличаются меньшими размерами продольного и поперечного диаметров мозговой коробки, более высоким сводом черепа, значительно более узким и низким лицом с более сильным выступанием его в горизонтальном сечении; более сильно выступающими носовыми костями и более углубленными клычковыми ямками.

Для определения степени выраженности монголоидных особенностей среднеазиатских краниологических се-

<sup>5</sup> Т. А. Трофимова, Краниологический очерк татар Золотой Орды, «Антропологический журнал», 1936, № 2.

<sup>6</sup> Неопубликованные материалы, любезно предоставленные автору для ознакомления Н. Г. Залкинд.

<sup>7</sup> О. Исмагулов, Антропологическая характеристика современных казахов по данным краниологии, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», 1963, т. 82; Н. Н. Миклашевская, Краниология киргизов, «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции», 1959, т. II.

риях составлена таблица 2<sup>8</sup>. Сопоставления были проведены по тем признакам, которые вполне определенно показывают, насколько существенны различия по выраженности монголоидных особенностей между сравниваемыми сериями.

Узбеки Южного Приаралья по степени выраженности монголоидных особенностей занимают промежуточное положение между армянами и тунгусами, приближаясь к армянам, что указывает на малую монголоидную примесь в изучаемой серии. Наименьшая примесь монголоидных элементов обнаружена у узбеков Ташкента. У узбеков Южного Приаралья эта примесь незначительно больше. По степени выраженности монголоидных признаков узбеки Южного Приаралья заметно отличаются от казахов и киргизов, приближаясь к величинам, характерным для европеоидов. Таким образом, проведенное сопоставление подтверждает вывод, установленный на основании анализа средних величин.

На черепках из Коканда из-за плохой сохранности не были определены высота переносья и выступание носовых костей. Если судить только по углам горизонтальной профилировки лица и углу выступания носовых костей, монголоидная примесь на них значительно сильнее, чем даже у киргизов и казахов.

Чтобы установить, имеется ли преемственность между узбеками Южного Приаралья с более древним населением этих мест, мы провели их сравнительную краниологическую характеристику (см. табл. 1).

От населения Миздахкана XIII—XIV вв. н. э. узбеки Южного Приаралья отличаются более уплощенным лицом, менее выступающими переносьем и носом, менее углубленными клыковыми ямками. Почти так же и различия между узбеками и населением Миздахкана IX—XII вв. н. э. От населения Миздахкана III—VIII вв. н. э. узбеки Южного Приаралья отличаются более брахикранной черепной коробкой, низким и значительно слабее профилированным в горизонтальной плоскости лицом и менее выступающими носовыми костями.

Изучаемая серия черепов относится к оседлым узбекам Южного Приаралья. Они являются потомками более древнего населения Миздахкана, которое оставило погребения в оссуариях и сосудах, цистах, обожженных сырцовым и обожженным кирпичом.

По всей вероятности, физический облик узбеков Южного Приаралья, в частности Миздахкана, сложился на рубеже I и II тысячелетий н. э., по-видимому, не раньше IX в., так как население Южного Приаралья в позднекушанское и афригидское время еще характеризовалось переходными чертами от типов восточносредиземноморской расы к типу Среднеазиатского междуречья.

В Миздахкане наличие монголоидной примеси отмечается в конце I тысячелетия н. э. В XIII—XIV вв. она постепенно увеличивается, достигая максимума во второй половине II тысячелетия н. э.

<sup>8</sup> Описание метода см.: В. П. Алексеев, Краниологические материалы к проблеме происхождения восточных латышей, «Сов. этнография», 1961, № 6.